

Hungarian translation of COVID-19 vaccine - Your guide to booster vaccination

English	Hungarian
<b>COVID-19 vaccine</b>	<b>COVID19 védőoltás</b>
<b>Your guide to booster vaccination</b>	<b>Útmutató az emlékeztető oltáshoz</b>
People aged 16 years and over, and those aged 12 years and over who are at risk (including health and social care workers) will be offered a booster dose of coronavirus (COVID-19) vaccine. Find out how to get your booster vaccination at <a href="http://www.nidirect.gov.uk/covid-vaccine">www.nidirect.gov.uk/covid-vaccine</a>	A 16 éves és ennél idősebb személyeknek, valamint a 12 éves és ennél idősebb veszélyeztetett fiataloknak (beleértve az egészségügyi és szociális gondozókat) felajánlják a koronavírus (COVID19) védőoltás emlékeztető adagját. Tudja meg, hogyan kaphatja meg az emlékeztető oltást a következő linkre kattintva: <a href="http://www.nidirect.gov.uk/covid-vaccine">www.nidirect.gov.uk/covid-vaccine</a>
<b>What is coronavirus or COVID-19?</b>	<b>Mi a koronavírus vagy COVID19?</b>
COVID-19 is a very infectious respiratory disease caused by the SARS-CoV-2 virus and is more serious in older people and those with certain health conditions.	A COVID19 egy rendkívül fertőző légzőszervi betegség, amelyet a SARS-CoV-2 vírus okoz, és amely súlyosabb idősebbek és bizonyos egészségi állapotú betegek körében.
<b>Why are you being offered a COVID-19 booster?</b>	<b>Miért ajánlanak fel Önnek COVID19 emlékeztető oltást?</b>
Like some other vaccines, levels of protection may begin to wane over time. The booster will help to reduce the risk of you needing admission to hospital due to COVID-19 infection this winter. Protection against severe disease from the first 2 doses seems to decline very slowly. Boosting your	Más oltásokhoz hasonlóan a védelmi szint idővel elkezdhet csökkenni. Az emlékeztető idén télen segít csökkenteni a COVID19 fertőzés miatti kórházba kerülés kockázatát. Az első két adagnak köszönhető súlyos betegségek elleni védelem úgy tűnik, nagyon lassan csökken. Az

Hungarian translation of COVID-19 vaccine - Your guide to booster vaccination

immunity should help to extend your protection into next year and give you longer term protection.	immunitás fokozása hozzájárulhat a védelem kiterjesztéséhez a következő évre, és hosszabb távú védelmet biztosít.
<b>When should you have a booster?</b>	<b>Mikor kell beadatni az emlékeztető adagot?</b>
Your appointment should be at least 3 months from your last dose, but you may be called later based on your age group or level of risk.	Az emlékeztető oltás beadásának időpontjáig, az utolsó adagtól számítva legalább 3 hónapnak kell eltöltenie, de az Ön korcsoportjától vagy kockázati szintjétől függően később is hívhatják.
You should not attend a vaccine appointment if you are self-isolating or waiting for a COVID-19 test. If you've had COVID-19, you will still need your booster but wait at least 4 weeks after your positive test (or 12 weeks if you are under 18 with no underlying health conditions).	Ne menjen el az oltási időpontra, ha házi karanténban van, vagy COVID-19 tesztre vár. Ha már átesett a COVID-19 betegségen, akkor is szüksége lesz emlékeztető oltásra, de várjon legalább 4 hetet a pozitív teszt eredmény után (vagy 12 hetet, ha nem töltötte be a 18 évet, és nem küzd egyéb egészségügyi problémákkal).
<b>Which vaccine will you be offered?</b>	<b>Melyik vakcinát fogják felajánlani neked?</b>
You will be given a booster dose of either Pfizer or Moderna vaccine*. Both vaccines boost well and have already been given to millions of people in the UK.	Önnek a Pfizer vagy a Moderna vakcina emlékeztető adagját fogják beadni*. Mindkét oltóanyag jól fokozza az immunitást, és az Egyesült Királyságban már több millió ember megkapta.
Studies have shown those aged 18 and over who can get the Moderna vaccine only need a half dose to	A tanulmányok kimutatták, hogy azoknak a 18 éves és ennél idősebb személyeknek, akik

## Hungarian translation of COVID-19 vaccine - Your guide to booster vaccination

boost the immune system well. This half dose of Moderna is expected to have a low rate of side effects including myocarditis. See page 3 for more information.	megkaphatják a Moderna oltást, csak fél adag oltóanyag szükséges az immunrendszer megfelelő erősítéséhez. A Moderna féladagja várhatóan alacsony mellékhatásokkal jár, beleértve a szívizomgyulladást is. További információkért lapozzon a 3. oldalra.
You will be offered the right vaccine for you which may be the same or different from the vaccines that you had before.	Az Önnek megfelelő vakcinát ajánlják fel, amely megegyezhet vagy eltérhet az előzőleg kapott oltóanyaguktól.
*You may be offered the AstraZeneca vaccine if this is what you had for your first doses and you cannot receive either of the other vaccines.	*Felajánlják Önnek az AstraZeneca oltást, ha korábban ezt kapta és nem kaphatja meg a többi oltás egyikét sem.
<b>Common side effects</b>	<b>Gyakori mellékhatások</b>
As with your previous dose the common side effects are the same for all COVID-19 vaccines used in the UK, and include:	Az előző adaghoz hasonlóan a gyakori mellékhatások ugyanazok az Egyesült Királyságban használt összes COVID19 vakcina esetében, többek között:
<ul style="list-style-type: none"><li>• having a painful, heavy feeling and tenderness in the arm where you had your injection. This tends to be worst around 1 to 2 days after the vaccine</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• karján, az oltás helyén kialakuló fájdalom, nehézségérzet, illetve érzékenység. Ez általában az oltás után 1-2 nappal a legrosszabb.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• feeling tired</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• fáradtságérzet</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• headache</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• fejfájás</li></ul>

Hungarian translation of COVID-19 vaccine - Your guide to booster vaccination

<ul style="list-style-type: none"> <li>general aches, or mild flu like symptoms</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>általános fájdalomérzet, vagy enyhe influenzaszerű tünetek</li> </ul>
<p>You can rest and take paracetamol (follow the dose advice in the packaging) to help make you feel better. Although feeling feverish is not uncommon for 2 to 3 days, a high temperature is unusual and may indicate you have COVID-19 or another infection.</p>	<p>Pihenjen és szedjen paracetamolt (tartsa be a dobozban található adagolásra vonatkozó utasításokat), ezek segíthetnek abban, hogy jobban érezze magát! Jóllehet nem ritka, hogy az ember 2-3 napig lázasnak érzi magát, de a magas láz ritka, és COVID19-re, vagy más fertőzésre utalhat.</p>
<p>Although a fever can occur within a day or 2 of vaccination, if you have any other COVID-19 symptoms or your fever lasts longer, stay at home and arrange to have a test. Symptoms following vaccination normally last less than a week. If your symptoms seem to get worse or if you are concerned, contact your GP.</p>	<p>Bár az oltástól számított egy-két napon belül láz léphet fel, ha bármilyen más COVID19 tünete van, vagy a láza hosszabb ideig tart, maradjon otthon és gondoskodjon egy teszt elvégzéséről! Az oltást követő tünetek általában egy hétnél rövidebb ideig tartanak. Ha a tünetek rosszabbodnak, vagy aggódik, forduljon háziorvosához!</p>
<p>You can also report suspected side effects of vaccines and medicines through the Yellow Card scheme. You can do this online by searching Coronavirus Yellow Card or by downloading the Yellow Card app.</p>	<p>A vakcinák és gyógyszerek feltételezett mellékhatásait a Yellow Card rendszeren keresztül is bejelentheti. Ezt online megteheti úgy, hogy rákeres a „Coronavirus Yellow Card”-ra, vagy a Yellow Card alkalmazás letöltésével.</p>
<p>Please see the back of the leaflet for more details.</p>	<p>További részletekért, kérjük, tekintse meg a tájékoztató hátoldalát.</p>

Hungarian translation of COVID-19 vaccine - Your guide to booster vaccination

<p><b>If you had serious side effects after any previous dose you may be advised to avoid or delay further vaccination. You should discuss this with your doctor or specialist.</b></p>	<p><b>Ha a korábbi adagok beadása után súlyos mellékhatásokat tapasztalt, akkor tanácsolhatják Önnek a további oltás elkerülését vagy elhalasztását. Ezt beszélje meg háziorvosával vagy a szakorvossal!</b></p>
<p><b>Serious side effects</b></p>	<p><b>Gyakori súlyos mellékhatások</b></p>
<p>Worldwide, there have also been recent, very rare cases of inflammation of the heart called myocarditis or pericarditis reported after Pfizer and Moderna COVID-19 vaccines.</p>	<p>Az utóbbi időben világszerte nagyon ritka esetekben szívizomgyulladást, ún. myocarditist vagy pericarditist jelentettek a Pfizer vagy Moderna COVID-19 védőoltás beadását követően.</p>
<p>These cases have been seen mostly in younger men within several days after vaccination. Most of these people recovered and felt better following rest and simple treatments.</p>	<p>Ezek az esetek nagyrészt fiatalabb férfiaknál fordultak elő, általában az oltást követő pár napban. Többségük meggyógyult és jobban érezte magát pihenést és egyszerű kezelésekkel követően.</p>
<p><b>You should seek medical advice urgently if, after vaccination, you experience:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• chest pain</li><li>• shortness of breath</li><li>• feelings of having a fast-beating, fluttering, or pounding heart</li></ul>	<p><b>Sürgősen forduljon orvoshoz, ha az oltást követően a következőket tapasztalja:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• mellkasi fájdalom</li><li>• légszomj</li><li>• olyan érzés, mintha gyorsan, szabálytalanul, vagy erősen verne a szíve</li></ul>

Hungarian translation of COVID-19 vaccine - Your guide to booster vaccination

<b>Is there anyone who shouldn't have a booster?</b>	<b>Vannak olyanok, akiknek nem ajánlják az emlékeztető oltást?</b>
There are very few people who should not have a booster.	Nagyon kevés olyan ember van, akinek az emlékeztető oltás nem ajánlott.
If you have had a severe reaction to a previous dose of the vaccine you should discuss this with your doctor.	Beszéljen orvosával, ha az oltás egyik korábbi adagja súlyos válaszreakciót váltott ki Önnél!
<b>Can you still catch COVID-19 after having the vaccine?</b>	<b>Az oltás után továbbra is elkaphatom a COVID19-et?</b>
The COVID-19 vaccination will reduce the chance of you suffering from COVID-19 disease. It may take a few days for your body to build up some protection from the booster.	A COVID19 védőoltás csökkenti a COVID19 betegség kialakulásának esélyét. Eltarthat pár héting, mire szervezetében az emlékeztető oltás hatására kialakul valamennyi védeeltség.
Like all medicines, no vaccine is completely effective – some people may still get COVID-19 despite having a vaccination, but this should be less severe.	A többi gyógyszerhez hasonlóan az oltások hatékonysága sem teljes, így vannak, akik az oltás ellenére is elkapják a COVID19-et, de a fertőzés kevésbé lesz súlyos.
<b>If you have not had the first vaccinations</b>	<b>Ha Ön nem kapta meg az első oltásokat</b>
If you have not yet had either of your first 2 doses of the vaccine you should have them as soon as possible.	Ha még nem kapta meg a vakcina első két adagjának valamelyikét, akkor azt a lehető leghamarabb adassa be!
<b>Further information</b>	<b>További információk</b>

Hungarian translation of COVID-19 vaccine - Your guide to booster vaccination

Visit coronavirus vaccination <a href="http://www.nidirect.gov.uk/covid-vaccine">www.nidirect.gov.uk/covid-vaccine</a>	Látogasson el a következő oldalra: <a href="http://www.nidirect.gov.uk/covid-vaccine">www.nidirect.gov.uk/covid-vaccine</a>
See the PHA leaflet on what to expect after vaccination, which is available to download at <a href="http://www.pha.site/COVID19InfoMaterials">www.pha.site/COVID19InfoMaterials</a>	Tekintse meg a PHA betegtájékoztatóját arról, hogy mire számíthat az oltás után! Ez a következő címről töltethető le: <a href="http://www.pha.site/COVID19InfoMaterials">www.pha.site/COVID19InfoMaterials</a>
Please read the product information leaflet for more details on your vaccine, including possible side effects, by searching Coronavirus Yellow Card. You can also report suspected side effects on the same website or by downloading the Yellow Card app.	Kérjük, olvassa el az oltás termékismertetőjét, beleértve a lehetséges mellékhatásokat is úgy, hogy rákeres a „Coronavirus Yellow Card” -ra. Ugyanazon a weboldalon vagy a Yellow Card alkalmazás letöltésével jelentheti a feltételezett mellékhatásokat.
<a href="https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk">https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk</a>	<a href="https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk">https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk</a>
You can read the information for UK recipients of the Pfizer and Moderna vaccines here:	A Pfizer és a Moderna vakcinákról szóló „Information for UK recipients of the Pfizer and Moderna vaccines” c. tájékoztatót elolvashatja itt:
<a href="https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk/productinformation">https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk/productinformation</a>	<a href="https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk/productinformation">https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk/productinformation</a>
Published January 2022 by the Public Health Agency.	Közzétette a Public Health Agency 2022 januárjában.
© Crown copyright 2022. This information was originally developed by UK Health Security	© Crown copyright 2022. Ezt a tájékoztatót eredetileg az UK Health Security Agency

Hungarian translation of *COVID-19 vaccine - Your guide to booster vaccination*

Agency and is used under the Open Government Licence v3.0	fejlesztette ki, és az Open Government License v3.0 keretében használatos
---	---