



Public Health
Agency

Mi az A csoportú Strep?

Az utóbbi időkben a szülőket megkérték, hogy figyeljenek oda az A csoportú streptococcus fertőzés – amely A csoportú Strep-ként is ismert –tüneteire. Ez a tájékoztató arra vonatkozóan nyújt plusz információkat, hogy mire kell odafigyelni.

Mi az A csoportú Strep?

Az A csoportú Strep közkeletű baktérium, amely ártalmatlanul él a torkunkban és a bőrünkön. Van néhány A csoportú Strep, amely enyhe betegségeket, mint például torokfájást, vagy súlyosabb betegségeket, mint például skarlátot, okozhat. Ezeket a betegségeket könnyen lehet antibiotikummal kezelni.

Az A csoportú Strep ritkán okoz nagyon súlyos betegséget mint például tüdőgyulladást (erős mellkasi fertőzés), szepszist (amikor a fertőzés a vérbe kerül) vagy csontfertőzést. Ezek a nagyon súlyos betegségek kórházi kezelést igényelnek.

Fontos emlékezni arra, hogy a legtöbb torokfájást vagy köhögést vírus okozza, és általában magától gyógyul.

Hogyan terjed az A csoportú Strep?

Az A csoportú Strep prüszkölés és köhögés által, valamint bőrön keresztüli közvetlen érintkezéssel terjed.

Mik az A csoportú Strep tünetei? Az enyhe A csoportú Strep az alábbiakat okozhatja:

- fájó, piros torok;
- láz;
- fehér bevonat a nyelven;



- bőrfertőzés;
- skarlát. A skarlát általában torokfájással, fejfájással, lázzal, duzzadt nyaki mirigyekkel kezdődik, amelye(ke)t általában kiütés kíséri, és ez néha olyan érzést kelt, mint a smirgli. A kiütést fekete vagy barna bőrön nehezebb látni, de mindenképpen érezhető.



A súlyosabb A csoportú Strep az alábbiakat okozhatja:

- magas láz;
- súlyos izomfájdalom;
- fájdalom, duzzanat és pirosság a seb helyénél;
- hasmenés és hányás.

Mit csináljak, ha a gyermekemnél A csoportú Strep tünetei mutatkoznak?

Amennyiben a gyermekénél A csoportú Strep tünetei mutatkoznak, hívja a körzeti orvosát vagy az ügyeletes orvost. Lásd www.nidirect.gov.uk/articles/gp-out-hours-service

Amennyiben a gyermeke antibiotikumot kap A csoportú Strep-re, legalább 24 óráig nem szabad iskolába mennie.

Kérjük sürgősen kérjen orvosi ellátást, ha:

- gyermeke rosszabbul van, mint általában;
- gyermeke állapota rosszabbodik;
- ez eltér a szokásos köhögésétől vagy megfázásától.

Tudunk-e bármit tenni az A csoportú Strep terjedése ellen?

Igen. Egyszerű cselekedetek nagy különbséget tehetnek. A rendszeres kézmosás mellett szappannal és vízzel, az alábbiakkal tudjuk csökkenteni az A csoportú Strep terjedését:

- kapja el – használjunk papír zsebkendőt, amikor köhögünk vagy prüszkölünk, és erre bátorítsuk a gyermekeket is;
- dobja ki – dobjuk ki a használt zsebkendőket a kukába;
- semmisítse meg – mossuk meg a kezünket szappannal és meleg vízzel.

Védőoltások

Győződjön meg arról, hogy a védőoltások naprakészek. Az Egyesült Királyságban az A csoportú Strep eseteinek az növekedése a közelmúltban, részben a társadalmi keveredésnek tudható be, amely ezzel egy időben más betegségek terjedését is eredményezheti.

A közegészségügyi hatóság ezért arra bíztat mindenkit, aki jogosult az ingyenes influenza elleni oltásra, hogy a lehető legkorábbi alkalommal adassa be azt. Főleg a két évet betöltött iskola kezdés előtti korban lévő, és a hathónap és kétéves kor közötti veszélyeztetett egészségű gyermekek szüleit bíztatjuk arra, hogy éljenek az ingyenes védőoltás lehetőségével.

Az alábbi hivatkozáson további információkat tudhat meg arról, hogy hol kaphat védőoltást: www.nidirect.gov.uk/wintervaccines