

Czym są „paciorkowce z grupy A”?

Ostatnio poproszono rodziców o zwracanie uwagi na oznaki infekcji paciorkowcami (Streptococcus) z grupy A. Ten dokument zawiera dodatkowe informacje o tym, na co należy zwrócić uwagę.

Czym są paciorkowce z grupy A?

Paciorkowce z grupy A to pospolite bakterie, którą mogą żyć w naszych gardłach i na naszej skórze, nie powodując szkodliwych objawów. Niektóre paciorkowce z grupy A mogą powodować choroby o łagodnym przebiegu, takie jak ból gardła, lub poważniejsze choroby, takie jak szkarlatyna. Choroby te można łatwo wyleczyć antybiotykami.

W rzadkich przypadkach paciorkowce z grupy A powodują bardzo poważne choroby, takie jak zapalenie płuc (ostre infekcje klatki piersiowej), posocznicę (gdy infekcja przedostaje się do krwi) lub infekcje kości. Te bardzo poważne choroby wymagają leczenia szpitalnego.

Należy pamiętać, że większość bólów gardła i kaszlu jest spowodowana przez wirusy i ustępują one same.

Jak rozprzestrzeniają się paciorkowce z grupy A?

Paciorkowce z grupy A rozprzestrzeniają się poprzez kichanie, kaszel i bezpośredni kontakt ze skórą.

Jakie objawy powodują paciorkowce z grupy A? Łagodne

paciorkowce z grupy A mogą powodować:

- ból, zaczerwienienie gardła;
- gorączkę;
- biały nalot na języku;



- infekcje skóry;
- szkarlatynę. Szkarlatyna zaczyna się od bólu gardła, bólu głowy, gorączki i obrzęku węzłów chłonnych szyi, po czym zwykle następuje wysypka, która czasami przy dotyku przypomina papier ścierny. Wysypki mogą być trudniejsze do zauważenia na czarnej lub brązowej skórze, ale nadal można je wyczuć.



Bardziej dotkliwy typ paciorkowców z grupy A może powodować:

- wysoką gorączkę;
- silny ból mięśni;
- ból, obrzęk i zaczerwienienie w miejscu zranienia;
- biegunkę i wymioty.

Co powinienem zrobić, jeśli moje dziecko ma objawy zakażenia paciorkowcami z grupy A?

Jeśli Twoje dziecko ma objawy zakażenia paciorkowcami z grupy A, skontaktuj się ze swoim lekarzem rodzinnym lub lekarzem dyżurnym. PatrzSee

www.nidirect.gov.uk/articles/gp-out-hours-service

Jeśli Twoje dziecko otrzyma antybiotyki na paciorkowce z grupy A, będzie musiało pozostać poza szkołą przez co najmniej 24 godziny.

Należy pilnie zwrócić się o pomoc lekarską, jeśli:

- Twoje dziecko czuje się znacznie gorzej niż zwykle;
- stan zdrowia Twojego dziecka się pogarsza;
- ma kaszel albo przeziębienie inne niż zwykle.

Czy możemy zrobić cokolwiek, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się paciorkowców z grupy A?

Tak. Proste czynności powodują dużą różnicę. Oprócz regularnego mycia rąk mydłem i wodą, możesz zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się paciorkowców z grupy A poprzez ich:

- złapanie – używaj chusteczek przy kaszlu lub kichaniu i zachęcaj dziecko do tego samego;
- wyrzucanie – wyrzuć zużyte chusteczki do kosza;
- zabijanie – umyj ręce ciepłą wodą z mydłem.

Szczepionki

Upewnij się, że dziecko ma aktualne szczepionki. Wzrost liczby niedawnych przypadków zakażeń paciorkowcami z grupy A w całej Wielkiej Brytanii może częściowo wynikać z większego mieszania się społeczności, co może również powodować jednoczesne krążenie zarazków innych chorób.

Dlatego PHA wzywa wszystkie osoby, które kwalifikują się do bezpłatnej szczepionki przeciw grypie, aby przy najbliższej okazji się zaszczepiły. Do skorzystania z bezpłatnej szczepionki przeciw grypie zachęcamy w szczególności rodziców wszystkich dzieci w wieku od 2 lat chodzących do przedszkola oraz dzieci w wieku od 6 miesięcy do 2 lat, które są w grupach ryzyka.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nidirect.gov.uk/wintervaccines